

作成日：令和5年7月28日
南筑後農業協同組合
南筑後普及指導センター

令和6年産 みなみ筑後の麦づくりこよみ



全量種子更新100%の実施！

喜ばれるみなみ筑後の麦作りを行いましょう！

- ① 全量種子更新の実施
- ② 土づくりの実施
- ③ 赤かび病防除の実施
- ④ タンパク質含有率等の向上

項目	11		12		1		2		3		4		5		6
	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上
生育期間	播種適期				栄養生長期間						幼穂伸長期間		登熟期間		
主な作業【資材名】(実施日)	優良種子の準備 土壌改良剤の準備 種肥の準備 播種機調整				3割以上の麦踏み① 追肥(小麦)① 土入れ(排水)①② 麦踏み②③ 追肥(大麦)③ 除草剤散布④ 麦踏み④ 土入れ(排水)③						種播期追肥		赤かび病防除 収穫		

※○印の数字は、作業回数を表わす。

品種特性表

区分	品種名	出穂期	成熟期	稈長	穂長	穂数	耐倒伏性	栽培上の注意点
小麦	シロガネコムギにしのやわら	4.10	5.28	80	8.1	556	極強	穂数の確保を図り、穂発芽に注意する。
	みなみのやわら	4.14	6.3	84	7.7	507	強	パン・中華用小麦。赤かび病・穂発芽に注意する。
大麦	はるしずく	4.8	5.21	87	6.9	583	強	早播きや播種量増は避け、適期播種適正播種量を守る。ヤギシロトビムシの害は小麦より出にくい。

※「みなみのやわら」は、「ミナミノカオリ」の特性を準用。



カラスノエンドウ



カズノコグサ



スズメノテッポウ



赤かび病

小麦の収穫期の水分と適切な収穫法

干実水分 %	適切な収穫法
25~30	コンバイン収穫はできるが品質をわずかに損う
20~24	コンバイン収穫に適する
17以下	脱粒などのロスが多く、品質が著しく悪くなる

	土壌水分
小麦	11.5%以下
大麦	12.5%以下

1. 播種適期・播種量

区分	播種適期	播種量
小麦	11月15日~11月30日	6~7kg/10a
大麦	11月25日~12月10日	5kg/10a

※適期播種に努める。
※大麦は早播きすると品質が低下し、選播きすると収量が低下します。
※5cm以上の深播きは行わない。
※播種が遅れた場合は、3割程度播種量を増やす。
※土壌が乾燥している場合は播種後鎮圧を行う。

2. 種子消毒

種子更新をしましょう!!

対象病害虫	薬剤名	処理方法および処理時期
斑葉病 裸黒穂病 なまぐさ黒穂病	ベンレートTコート	乾燥種子重量の0.5% 【種子10kgに50g】を種子粉衣する。
ヤギシロトビムシ(小麦のみ)	クルーザー-FS30	乾燥種子1kg当り原液6ml 【種子10kgに60ml】を塗抹処理する。
大麦 網斑病・斑葉病	キヒゲンR-2	乾燥種子1kg当り原液20ml
小麦 なまぐさ黒穂病	フロアブル	【種子10kgに200ml】を塗抹処理する。

※クルーザー-FS30を使用する場合は、種子10kgに対し水60mlを馴染ませた後、クルーザー-FS30を60ml塗抹処理し、殺菌剤(ベンレートTコート)を種子粉衣する。

3. 土づくり基準

排水対策	地下排水	有材暗渠・弾丸暗渠
表面排水	ほ場周回・うね間(枕地に溝を切り排水溝に通す)	
有機物の施用	腐わら 全量12~15cmの深さですき込む	
	肥料 牛ふん(発酵処理物)~2t	
土壌改良資材	資材名	10a当り施用量
	どれ太郎	60kg
	ミネラルG	160kg
酸度矯正資材	炭酸石灰石灰	200kg
	消石灰	160kg

※特に大麦は、酸性土壌に弱いため酸性矯正資材を投入する。
※堆肥散布後は、直ちにすき込みを行う。
※種わら、堆肥は必ず有機物の腐田としてすき込む。

4. 施肥基準 (適期播)

※タンパク質含有率を上げるため一発追肥又は2回追肥を行いましょう!

施肥項目・時期及び肥料	基肥	一発追肥(1回)	追肥	穂揃期追肥
品種名	ちくごめめぐみ444(14-14-14)	小麦 1月中旬~1月下旬	小麦 1月中旬~1月下旬 小麦 2月下旬~3月上旬 大麦 2月上旬~下旬	4月下旬(穂揃期) 成女(21-0-0)
小麦 シロガネコムギにしのやわら	40kg	麦追肥一発2号(24-0-5) 40kg	NK2号(16-0-16) 30kg NK2号(16-0-16) 10kg	—
小麦 みなみのやわら	40kg	硬質小麦専用追肥(30-0-4) 40kg	NK2号(16-0-16) 30kg NK2号(16-0-16) 10kg	10~15kg
大麦 はるしずく	20kg	—	NK2号(16-0-16) 20kg	—

※大豆後作は基肥を大麦小麦ともに50%程度減量し、追肥についても生育状況により加減する。
※種わらを全量すきこむ場合は基肥を10kg増量する。
※追肥の後は効果を安定させるため土入れを必ず実施する。
※みなみのやわらは、タンパク質含有率を上げるために、穂揃期の追肥(実肥)を実施する。

5. 病害虫防除

対象病害虫	薬剤名	処理方法	使用回数	使用時期
赤かび病	トップジンM粉剤DL	4kg/10a	出穂期以降	収穫14日前まで
	トップジンM水和剤	1000~1500倍 100l/10a	小麦2回以内 大麦1回以内	小麦 収穫14日前まで 大麦 収穫30日前まで
	ミラビスフロアブル	8~16倍 0.8l/10a (無人航空機散布) 1500~2000倍 100l/10a	2回以内	小麦 収穫7日前まで 大麦 収穫14日前まで
	トップジンMゾル(無人航空機散布)	8倍 0.8l/10a	出穂期以降 小麦2回以内 大麦1回以内	小麦 収穫14日前まで 大麦 収穫21日前まで

※みなみのやわらは、赤かび病に弱いため2回防除を行う。1回目はミラビスフロアブル、2回目はトップジンM水和剤・ゾルの使用を基本とする。

6. 除草基準

土壌処理剤を必ず使用しましょう。

区分	薬剤名	処理時期	10a当り使用量(撒布量)	使用上の注意事項
雑草多発田	バスタ液剤	播種前又は播種後出芽前	300~500ml(100~150l)	農地及び畦畔には必ず農耕地用除草剤を使用する。
	ラウンドアップマックスロード	耕起前又は播種後出芽前	200~500ml(25~100l)	
土壌処理剤	クリアターN乳剤	播種直後(雑草発生前)	500~700ml(70~100l)	乳剤、粒剤ともに排水不良田や降雨(特に大雨)の前後には使用しない。
	クリアターN粒剤DF	播種後~麦2葉期(雑草発生前~イネ科雑草1葉期まで)	4~5kg	
	リベレーターG(粒剤)	播種後~麦3葉期(雑草発生前~イネ科雑草1葉期まで)	60~80ml(100l)	
	リベレーターフロアブル	播種後~麦3葉期(雑草発生前~発始期)	4~5kg	
茎葉処理剤	ハーモニー粒剤DF	播種後~節間伸長前	5~10g(100l)	一年生広葉雑草の残存雑草の多い場所に散布する。除草剤抵抗性スズメノテッポウには効果がないので注意する。
	ハーモニーDF	播種後~節間伸長前	5~10g(100l)	
	エコバートフロアブル	麦節間伸長開始期まで(広葉雑草2~4葉期まで)	50~100ml(100l)	

※バスタ液剤、ラウンドアップマックスロード、ハーモニーDFの散布については周辺作物に葉害を与えるため、散布時の飛散(専用ノズルの使用)に十分注意する。
※ハーモニーDF散布に用いた器具類は消石灰500倍液を10分間循環させた後、水洗いをする。
※ハーモニー細粒剤F・ハーモニーDFはどちらか一剤だけ、1回だけの散布。
※土壌処理剤は土壌が大きいと葉害がでやすいので十分砕土を行い、2~3cmの深さに播種する。
※カラスノエンドウは、除草剤散布に加え、花が咲く頃までに必ず抜き取る。
※広葉雑草には、ハーモニーDF5gにサーファクタント30を加用する。

7. 適期管理作業

適期管理作業が速やかに行えるように、排水対策を行っておくことが基本。

- (1) 土入れ 雑草や無効分げつの抑制・倒伏防止・表面排水等の効果がある。1月上旬~中旬(本葉3~4枚頃)・2月上旬~中旬・3月上旬の土壌の乾燥した日に行う。第1回目は浅く、2回目、3回目と麦の生育にともなって土の量を増やしていく。
- (2) 麦踏み 分げつ促進と徒長の防止に効果がある。1月上旬~2月中旬(節間伸長開始まで)に土壌の乾燥した午後3~5時に行う。
- (3) 土入れ・麦踏み作業での注意事項
 - ① 土入れは麦踏み前に行い、麦踏み直後には行わない。
 - ② 麦踏みは茎葉に霜・露があるとき行うと損傷が大きい。また、土が湿っている時に行くと土をしめつけることにより、その後の生育を抑制するので注意する。

8. 倒伏防止対策

- 《基本対策》
- (1) 適期に適量の播種を行う。
 - (2) 踏圧・土入れ、排水対策などの管理作業を徹底する。

南筑後農業協同組合農畜産課 ☎(63)-8814
南筑後普及指導センター ☎(62)-4191
瀬高グリーンセンター ☎(62)-4111
大牟田グリーンセンター ☎(56)-8915
山川グリーンセンター ☎(67)-1214
高田グリーンセンター ☎(22)-3218

農薬の安全使用と飛散防止対策を徹底しましょう!



お米づくりはまず「土力の素・ミネラルG」の投入から

選ばれる「みなみ筑後」の米づくり重点事項

1. 売れる米づくり (1) 品質の良い米づくり

(2) うまみ米づくり (2) うまみ米づくり

(3) 省力・低コストで安全な米づくり

2. 農作業事故ゼロ

品質特性表 table with columns: 熟期, 品種名, 播種期, 出穂期, 成熟期, 株高, 穂長, 穂重, 容重, 水分, 粒重, 品質, 食味, 栽培性

スタミノンガイ(ジャンボタニシ)防除剤

防除剤使用表 table with columns: 種類, 剤名, 散布時期, 10a使用量

農薬防除要領


農薬防除要領 table with columns: 農薬名, 主成分, 効果, 注意点

福わら、妻わらは良質な有機質！全量すき込みを実施し、開断かん水でガス抜きを徹底！

施肥項目及び肥料表 table with columns: 施肥項目, 肥料名, 散布時期, 10a当り散布量

- 施肥の注意事項 1. 堆肥や土壌改良材の使用... 2. 堆肥の散布方法...

水管理



以下の時期を除き原則として生育期間を通して開断かん水を行う。...

JA 米生産基準

- 1. 肥料・農薬・生産資材は原則として、ごよみ・資材の注文書に記載されているものを使用すること。

稲苗育苗基準

- 1. 育苗開始時期 20播種/10a(目安)

④ 出芽および稲土育苗時... ⑤ 出芽および稲土育苗時...

消毒済種子を使用の方は、別添資料をご確認下さい

消毒済種子の使用の方は、別添資料をご確認下さい

消毒済種子の使用表 table with columns: 剤名, 使用時期, 10a当り使用量, 使用方法

夢つくし元気づくし剤型別防除体系

夢つくし元気づくし剤型別防除体系 (JA 米生産基準) content including tables for 粉剤体系, 液剤体系, 豆つぶ剤体系, and 無人航空機利用の防除体系.

ヒノヒカリ剤型別防除体系

ヒノヒカリ剤型別防除体系 (JA 米生産基準) content including tables for 粉剤体系, 液剤体系, 豆つぶ剤体系, and 無人航空機利用の防除体系.



JAみなみ筑後つやおとめ特別栽培米研究会 令和6年産ふくおかエコ農産物認証つやおとめ栽培こよみ


化学合成農薬の成分回数と化学肥料の使用量を、ともに県基準の半分以上で生産する栽培計画を認証する制度です。
【農業成分数10成分以下・化学窒素量4.25以下】

令和5年12月
南筑後農業協同組合
南筑後普及指導センター

◇品種特性

出穂期	成熟期	稈長	玄米千粒重	耐倒伏性	いもち病耐病性
8月30日	10月13日	81cm	20.9g	強	中

◇品質向上対策 1. 田回りを徹底し田んぼの中をよく観察しましょう。 2. 土づくりを行い地力を増強しよう。 3. 田植え適期 6月25日以降 4. 落水時期 収穫5~7日前



収量・品質向上のポイントは…「土づくり！」
(※まずは、稲わら・麦わらのすき込みから)

- ケイ酸は、稲体を強化し、倒状や病虫害の発生を抑制します。
- 鉄分は、根を守り、根腐れを防ぎます。
- 腐植は、土づくりの基本です。地力を向上させ、肥料の効果を安定させます。

◇土壌改良資材: 散布日 月 日 ~ 月 日

土壌改良資材	10a当りの使用量	主要成分【保証成分】
ミネラルG	200kg	苦土2%・ケイ酸17~20% 鉄分13~18%・アルカリ分40%
土力の素	45kg	りん酸5%・カリ6%・苦土7% ケイ酸20%・アルカリ分15%
オイスターミネラル	60kg	ケイ酸17%・アルカリ分45%

◇育苗培土: 散布日 月 日 ~ 月 日
下記より1つ選択し使用する。

使用用途	資材	使用量	10a当り化学窒素量
稚苗用	筑後化成培土	1箱3.5kg程度	0.26kg(70kg使用)
稚苗用	みのりエース	1箱3.5kg程度	0.23kg(70kg使用)

◇施肥基準【基肥 月 日 ~ 穂肥① 月 日 ~ 穂肥② 月 日 ~】
下記より1つ選択し使用する。

体系	使用用途	資材	成分%	使用量/10a(化学窒素量)
分施	基肥	スーパーユーキくん2号	12-5-5	30kgまで(1.7kg)
	穂肥①	スーパーユーキくん3号	10-3-8	20kgまで(1.0kg)
一発	基肥一発	有機エムコート355	13-5-5	50kgまで(3.25kg)
分施	基肥+穂肥①	バイオ液肥	0.26-0.07-0.05	4t+2.5t(0kg)
分施	穂肥②	バイオ液肥	0.26-0.07-0.05	0.5t(0kg)

※バイオ液肥を使用した場合は、「土力の素」等で土壌改良に積極的に取り組む。

※地力及び生育状況によって、使用量の範囲内で加減してください。
※基肥一発肥料については、気候によって効果がばらつきます。
※地力の高いほ場では、基肥を5~10kg減肥し、穂肥2回施用を励行してください。

◇箱施肥: 散布日 月 日 ~ 月 日

資材名	成分数	使用量	使用時期	備考
防人(さきもり)箱粒剤	【3成分】	1箱50g	は種時(覆土前)~移植当日	いもち病・ウンカ類・コブノメイガ等

◇除草剤: 散布日 月 日 ~ 月 日 下記より1つ選択し使用する。

資材名	成分数	10a当りの使用量	使用時期	備考
プライオリティ1キロ粒剤	【2成分】	1kg(1袋)	移植時~ノビエ3.5葉期	田植同時散布の場合は、田植終了後に必ず5cmの水位まで溜める。
プライオリティフロアブル	【2成分】	500ml(1本)	移植直後~ノビエ3.5葉期	水口施用可能。使用前に容器をよく振って使用する。
プライオリティジャンボ	【2成分】	250g(小包装10個)	移植直後~ノビエ3.5葉期	やや深めの湛水(5cm)にして水の出入りを止め散布する。

※処理時期が遅いと効果が低くなりますので、使用時期以内で早めの散布を心がけてください。

◇ジャンボタニシ対策: 散布日 月 日 ~ 月 日

資材名	成分数	10a当りの使用量	使用時期	備考
スクミノン	【1成分】	1~4kg	収穫60日前まで	ジャンボタニシ被害多発田の場合に散布する。

◇補正防除: 散布日 月 日 ~ 月 日
※葉いもち多発の場合は、コラトップジャンボP【1成分】を施用。【初発20日前~初発時に小包装10~13個/10a】
※紋枯病多発の場合は、モンガリット粒剤【1成分】を施用。【3~4kg/10a(収穫30日前まで)】

◇基幹防除: 散布日 月 日 ~ 月 日 下記より選択し使用する。

資材名	成分数	10a当りの使用量	使用時期	備考
トレボン粉剤DL	【1成分】	3~4kg	収穫7日前まで	ウンカ類・カメムシ類・コブノメイガ
トレボン乳剤	【1成分】	1000~2000倍・100ℓ	収穫14日前まで	ウンカ類・コブノメイガ1000倍 カメムシ類2000倍
トレボンスカイMC	【1成分】	16倍・0.8ℓ	収穫14日前まで	ヒメトビウンカ・カメムシ類【無人航空機による散布】
なげこみトレボン	【1成分】	水溶性容器10個(500ml)	5葉期以降 収穫21日前まで	ウンカ類【湛水散布】
スタークル粉剤DL	【1成分】	3kg	収穫7日前まで	ウンカ類・カメムシ類
スタークル顆粒水溶剤	【1成分】	2000~3000倍・100ℓ	収穫7日前まで	カメムシ類2000倍、ウンカ類3000倍
スタークル液剤10	【1成分】	8倍・0.8ℓ	収穫7日前まで	ウンカ類・カメムシ類【無人航空機による散布】
スタークル豆つぶ	【1成分】	250~500g	収穫7日前まで	ウンカ類250~500g・カメムシ類250g【湛水散布】

※本田防除は、害虫の発生状況及びほ場の立地状況によって使用する薬剤を決定してください。
※なげこみトレボンは8月末まで、9月以降はスタークル豆つぶを、湛水(水を全体に3cm溜めて)散布します。その後、水が無くなるまで水は足さないようにします。

※減農薬・減化学肥料栽培であり成分数に限りがある為、こよみに記載している肥料・農薬以外には使用できません。
※こよみ以外の肥料・農薬を使用した場合は、必ず農協に報告してください。
「ふくおかエコ農産物」としての出荷はできなくなります。



瀬高地区もち米部会 令和6年産ヒヨクモチ栽培こよみ

令和5年12月
南筑後農業協同組合
南筑後普及指導センター

◇品種特性

出穂期	成熟期	稈長	玄米千粒重	耐倒伏性	いもち病耐病性
9月6日	10月26日	69cm	21.5g	極強	やや弱

◇品質向上対策

1. 田回りを徹底し田んぼの中をよく観察しましょう。 2. 土づくりを行い地力を増強しよう。 3. 田植え適期 6月25日以降 4. 落水時期 収穫5~7日前

月旬	6月			7月			8月			9月			10月								
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
生育ステージ	育苗期間			活着期間			有効分けつ期間			無効分けつ期間			幼穂形成期			出穂期	穂揃い期	登熟期間			成熟期
水管理	浅水たん水			間断かん水			中干し	間断かん水			浅水たん水			間断かん水			落水				
主な作業	耕起・代かき 田植え			畦草除草作業			中干しは、ひびが割れる黒乾状態まで確実に!			この時期までに畦草除草作業を終える			補正防除			収穫					
	バイオ液肥散布			箱施薬			基本防除			バイオ液肥 穂肥① 穂肥②			堆肥・土壌改良資材の施用 基肥散布 除草剤散布			稲わらすき込み					

収量・品質向上のポイントは…「土づくり！」
(※まずは、稲わら・麦わらのすき込みから)

- ケイ酸は、稲体を強化し、倒状や病虫害の発生を抑制します。
 - 鉄分は、根を守り、根腐れを防ぎます。
 - 腐植は、土づくりの基本です。地力を向上させ、肥料の効果を安定させます。
- ◇土壌改良資材：散布日 月 日～ 月 日

土壌改良資材	10a当りの使用量	主要成分【保証成分】
ミネラルG	200kg	苦土2%・ケイ酸17~20% 鉄分13~18%・アルカリ分40%
土力の素	45kg	りん酸5%・カリ6%・苦土7% ケイ酸20%・アルカリ分15%
オイスターミネラル	60kg	ケイ酸17%・アルカリ分45%

◇育苗培土：散布日 月 日～ 月 日

使用用途	資材	使用量
稚苗用	筑後化成培土	1箱3.5kg程度
稚苗用	みのりエース	1箱3.5kg程度

◇施肥基準【基肥 月 日～・穂肥① 月 日～・穂肥② 月 日～】

体系	使用用途	資材	成分%	使用量/10a
分施	基肥	ちくごのめぐみ444	14-14-14	35kg
	穂肥1回目	NK化成2号	16-0-16	20kg
	穂肥2回目	NK化成2号	16-0-16	15kg
一発	基肥一発	晩生一発エムコート44	22-12-10	40~50kg
分施	バイオ液肥	みのるん	0.26-0.07-0.05	5t+3t

- ※バイオ液肥を使用した場合は、「土力の素」等で土壌改良に積極的に取り組む。
- ※地力及び生育状況によって、使用量の範囲内で加減してください。
- ※基肥一発肥料については、気候によって効果がばらつきます。
- ※地力の高いほ場では、基肥を5~10kg減肥し、穂肥2回施用を励行してください。

※スタークル剤の使用については、出穂時期～開花時期での散布はミツバチに悪影響をおよぼしますので使用しないでください。
※なお、近隣にハウスや野菜等の作付けがある場合は、数日前に防除する旨を伝え、薬剤の飛散が無いように防除してください。

◇箱施薬：散布日 月 日～ 月 日

資材名	使用量	使用時期	備考
防人(さきもり)箱粒剤	1箱50g	は種時(覆土前)～移植当日	いもち病・ウンカ類・コブノメイガ等

◇除草剤：散布日 月 日～ 月 日

資材名	10a当りの使用量	使用時期	備考
プライオリティ1キロ粒剤	1kg(1袋)	移植時～ノビエ3.5葉期	田植同時散布の場合は、田植終了後に必ず5cmの水位まで溜める。
プライオリティフロアブル	500ml(1本)	移植直後～ノビエ3.5葉期	水口施用可能。使用前に容器をよく振って使用する。
プライオリティジャンボ	250g(小包装10個)	移植直後～ノビエ3.5葉期	やや深めの湛水(5cm)にして水の出入りを止め散布する。

※処理時期が遅いと効果が低くなりますので、使用時期以内で早めの散布を心がけてください。

◇ジャンボタニシ対策：散布日 月 日～ 月 日

資材名	10a当りの使用量	使用時期	備考
スクミノン	1~4kg	収穫60日前まで	ジャンボタニシ被害多発田の場合に散布する。

◇本田の病虫害防除

体系	時期	基本防除(対象病虫害)	
		8月上中旬	9月中下旬
粉剤	ダブルカットバリダスタークル粉剤3DL 3~4kg/10a (いもち病、紋枯病、ウンカ類、カメムシ類)【穂揃い期まで】	スタークル粉剤DL 3kg/10a (ウンカ類、カメムシ類)【収穫7日前まで】	
		スタークル顆粒水溶剤 100ℓ/10a 2000倍(カメムシ類) 3000倍(ウンカ類) 【収穫7日前まで】	
		スタークル豆つぶ 250~500g/10a(ウンカ類)、250g/10a(カメムシ類) 【収穫7日前まで】	
液剤	モンセレンフロアブル 1500倍(紋枯病)	スタークル顆粒水溶剤 100ℓ/10a 2000倍(カメムシ類) 3000倍(ウンカ類) 【収穫7日前まで】	
	ロムタンゾル 100ℓ/10a 1000倍(コブノメイガ)		
	オーケストラフロアブル 100ℓ/10a 1000倍(ウンカ類幼虫)		
豆つぶ剤	ワイドパンチ豆つぶ 250g/10a (いもち病、紋枯病、ウンカ類、カメムシ類)	スタークル豆つぶ 250~500g/10a(ウンカ類)、250g/10a(カメムシ類) 【収穫7日前まで】	

- ※葉いもち多発の場合は、コラトップジャンボPを施用。【初発20日前～初発時に小包装10~13個/10a】
- ※紋枯病多発の場合は、モンガリット粒剤を施用。【3~4kg/10a(収穫30日前まで)】
- ※スタークル豆つぶは、湛水(水を全体に3cm溜めて)散布する。その後、水が無くなるまで水は足さないようにする。



みなみ筑後の大豆づくりによる

作成：令和5年12月
南筑後農業協同組合
南筑後普及指導センター

大豆づくりはまず土づくりと適期播種から

令和6年産

喜ばれる「みなみ筑後」の大豆づくり重点事項

- ① 収量・品質の向上
 - ② 基本技術の励行 (適期播種、排水対策、中耕・培土、病害虫・雑草防除)
 - ③ 種子更新率100%
- (2) 安全・安心な大豆生産
- ① 栽培履歴・GAP (農業生産工程管理) の全出荷者記載・提出
 - ② 農業適正使用と飛散防止対策の徹底
 - ③ 発生予防に基づき適期防除による農薬使用回数の低減

品種特性表

品種名	開花期	成熟期	主茎長	耐倒伏性	10a当り収量
ちくしB5号	8月20日	11月2日	67cm	やや強	366kg

※7月10日播種

播種時期・栽培密度標準 (2粒点播の場合)

播種時期	7月5日～19日 (適期播)	7月20日以降 (遅播)
播種量 (kg/10a)	3.0～5.0	6.0～7.0
条間・畦幅 (cm)	70、140	
株間 (cm)	25	15～20

施肥基準

播種時期	7月上旬～中旬 (適期播)	7月下旬以降 (遅播)
土壌改良材	ミネラルG 200kg 土力の素 45kg	
土壌改良材入り肥料	e-green 4-4-20 40kg	

10a当り


除草剤基準

使用時期	除草剤名	10a当り使用量	10a当り散布回数	使用上の留意点
播種前 (雑草が多い場合)	ラクトプロアツクゾード	200～500ml	25～100回	飛散防止対策を徹底する
	サクサ液剤	300～500ml	100回	
播種後出芽前 (雑草発生前)	ラクサー粒剤	4～8kg	—	種子を丁寧に扱い、覆土を十分に行う
	ラクサー乳剤	400～800ml	100回	1年生雑草
	フルミオWDG	5～10g	100回	ホトカサ類、ホソアサギ、ラクサー乳剤と混用
雑草生育期(8月) イネ科雑草 3～10葉期	ホルトフロアブル	200～300ml	100回	1年生イネ科雑草 (又ヌカカサを除く) 収穫30日前まで
	大豆バサラン液剤	100～150ml	100回	アサガオ類
大豆2葉期～開花前	アタックソット乳剤	30～50ml	100回	カラライナツクサ 収穫45日前まで

※特にフルミオWDGを使用する場合は、散布器・タンク・ホース・ノズルは専用の洗浄剤で丁寧に洗浄する。

難防除雑草の防除法

アサガオ類やホオズキ等の防除は、初期除草剤散布のみでは不十分であるため、中期除草剤、中耕培土を組み合わせて、実施する。



病害虫防除基準

防除時期	対象病害虫	薬剤名	10a当り使用量	使用回数	備考
発生時 8月中～下旬	メハシヨウ	スミチオン乳剤	1,000倍 水100ℓ	4回以内	無人航空機 散布
		カスター乳剤	4,000倍 水100～150ℓ 32倍 0.8ℓ	2回以内	
9月 上中旬	ハスモンヨトウ	ラクトプロアツクゾード	2,000倍 水100～150ℓ	3回以内	無人航空機 散布
		ホルトフロアブル	2,000倍 水100～150ℓ 16倍 0.8ℓ	2回以内	
		スタークル液剤10	1,000倍 水150ℓ 8倍 0.8ℓ	2回以内	
		トリアジウム水和剤	700～1,500倍 水150ℓ 16倍 0.8ℓ	4回以内	
9月 上中旬	カメムシ類	スタークル液剤10	8倍 0.8ℓ	2回以内	無人航空機 散布
		アミスター20フロアブル	16倍 0.8ℓ	2回以内	

※高温年には、成熟期後半まで加害が続くので、2回目防除を必ず実施する!!

月	旬	主な作業	作業内容
6	中	土づくり (雑草防除)	「ちくしB5号」とする。 【品種特性表】 参照 【施肥基準】 参照 PHDの矯正 6.0程度に矯正 e-green 4-4-20 40kg/10aを投入 地力増強のため麦ワラや堆肥などの有機物や、ミネラルG 200kg/10a、土力の素45kg/10aを投入し、地力を維持する。 【除草剤基準】 参照 キヒゲンR-2フロアブル を種子1kg当り20ml塗沫またはキヒゲンを種子1kg当り10g粉衣する。(鳥の食害防止) または、 クルーサーMAXX を種子1kg当り8ml塗沫する。(鳥の食害防止ネキリムシ対策:湿害軽減) 【ロータリー耕で充分砕土を行い、同時に播種する。】 ※梅雨明け後は、ほ場が乾燥し過ぎる前に、遅やかに5cm以上の深さで播く。 ※鳥害回避の為に一斉播種を行う。部分表耕播種や組作業で適期播種を行う。
7	中	雑草防除	【除草剤基準】 参照
7	中	補植	欠株が多い場合は、密植部分から根に株元の土を多くつけた状態で補植する。(追播は、成熟期が異なるため行わない)
8	中	中耕・培土	播種後15日頃 (本葉3枚頃)
8	上	中耕・培土	播種後25～30日頃 (本葉5枚頃)
8	中	害虫防除 (ハスモンヨトウ) (葉斑病)	【病害虫防除基準】 参照 【病害虫防除基準】 参照 【白変葉 (ハスモンヨトウ孵化直後) の手取り除去を行う。】
9	中	畦間かん水	子実肥大期に、ほ場が乾燥しすぎるようであれば、かん水を実施する。
10	上	成熟期刈取	乾燥した時期
10	中	青立林採取	刈り取り前に、青立ち株や雑草を採取する。
11	中	乾燥調整	成熟期は大部分が落葉し、莢を振ると音をたてる程度に乾燥した時期 刈取適期は、成熟期～成熟期後10日頃まで (汎用コンバインでの刈取は成熟期後7～14日頃) 脱粒機は、損傷粒が発生しないように回転数に気をつける。



農薬適正使用と飛散防止対策を徹底しましょう!

南筑後農業協同組合 農畜産課
TEL(63)8814
TEL(62)4191
TEL(62)4111
TEL(67)1214
TEL(67)3218
TEL(22)8915

